



Conférence Grand Angle Viande



#GAViande

En collaboration avec :



11^e édition
Mercredi 13 novembre 2024



Conférence Grand Angle Viande
11^e édition
Mercredi 13 novembre 2024



Maladies vectorielles et émergentes : actualités et perspectives

Valérie DAVID (Idele)

David NGWA-MBOT (GDS France)

Eva GROSHENS et Hélène FUCHEY (Idele)



En collaboration avec :



Multiplication des épisodes sanitaires liés à des maladies vectorielles

Maladies vectorielles : Maladies infectieuses transmises par des vecteurs, essentiellement insectes et acariens hématophages

*Les vecteurs sont nombreux ...
...culicoïdes, stomoxes, taons, puces, moustiques ...
et sans oublier les tiques*

Des maladies non zoonotiques présentes en France

- FCO ... une succession de souches et de variants depuis 2006
- Schmallenberg ... arrivée en 2011
- MHE.. depuis sept 2023
- Besnoitiose

Des maladies non zoonotiques sous surveillance événementielle en Europe

- Dermatose nodulaire contagieuse
- ...

Des maladies zoonotiques asymptomatiques chez les ruminants présentes en France

- Fièvre hémorragique de Congo Crimée
- Encéphalite à Tiques
- etc ..

Transmission à l'homme
- tiques
- et via les fluides ou sangs des animaux d'élevage porteurs

Transmission à l'homme
- tiques
- et produits laitiers au lait cru

Des maladies zoonotiques non présentes en Europe

- Fièvre de la vallée du Rift
- etc ..

Situation

• Europe

Situation sanitaire FCO-3 saison 2024 (28/10/2024)

Belgique > 3668 foyers

Allemagne > 12 929 foyers dont > 3 500 confirmés BTV 3


Autriche : 7 foyers

Danemark > 791 foyers

Pays-Bas > 2165 foyers cliniques

Espagne : 201 foyers

Arrivée de la FCO-12 au Pays-Bas (plus de 8 foyers avec un situé à 10 kms de l'Allemagne)



Situation


- Française

Données au 08/11/2024

Cas cliniques confirmés





Source : GDS France




Les maladies vectorielles : des restrictions de mouvements nécessaires pour limiter la propagation

- Comment sortir d'une zone régulée?



OU



Des impacts sanitaires et zootechniques très variables

Des signes cliniques pas très spécifiques (exemple de la MHE) :

☐ Fièvre, anorexie, abattement, amaigrissement.

☐ Boiteries, démarche raide.



☐ Congestion, ulcères des lèvres/dans la bouche, langue qui pend

☐ Conjonctive /Larmolement/Yeux exorbités.

☐ Oedème péri-oculaire / Jetage nasal.

☐ Congestion, pétéchies, érosions/ulcères/croûtes sur le mufle.

(GDS BFC)



Des impacts sanitaires et zootechniques qui restent à objectiver

1. Animaux malades
2. Hausse de la mortalité des vaches
3. Baisse de la production laitière
4. Avortements
5. Naissances prématurées et poids de naissance inférieurs voire animaux chétifs
6. Baisse de fertilité / allongement de l'IVV
Impact sur la fertilité des mâles ?
7. Diminution du GMQ

Une variabilité importante des impacts selon les élevages

Exemple des travaux d'évaluation des premiers impacts cliniques de la nouvelle souche de BTV 8.

Evaluation réalisée début oct 2023

Des troupeaux affectés depuis au moins 1 mois et au plus 2 mois




Figure 1 : Distribution des élevages ovins et bovins en fonction de la morbidité observée




Figure 2 : Distribution des élevages ovins et bovins en fonction de la mortalité observée

(GDS 12, Plateforme ESA, DDETSPP 12- publication 21/12/2023)

Evolution de la mortalité des vaches allaitantes de juillet 2023 à fin sept 2024


2023 – T3

2023 – T4



2024 – T1

2024 – T2


2024 – T3



Arrivée BTV 8 new
aout - sept 2023



Arrivée du BTV 3
en août 2024



BTV8 et
BTV3 ?

Arrivée MHE
début sept 2023

T4 2023 : Gros impact mortalité dans les Pyrénées + Aveyron

T1 2024 : Impact plus diffus Massif central, un peu + fort Sud-Ouest

T3 2024 : impact visible dans le nord est ?

Nb de vaches mortes pendant le trimestre / effectifs de vaches présentes
en début de trimestre, comparé au taux moyen des 3 années précédentes
pour le même trimestre


GEB - Idelle d'après SPIE-BDNI et Normabev



France entière : Une surmortalité des vaches allaitantes adultes observée dès le 4ème trimestre 2023 et qui se poursuit en 2024

Evolution du taux de mortalité par trimestre - Vaches femelle type V

GEB - Idele d'après SPIE-BDNI et Normabev




Entre Oct 2023 et Sept 2024
Une surmortalité de **14 %**
des vaches allaitantes adultes
au niveau France entière

Anomalie estimée à + 11 700 têtes, sur un total de 97 400
vaches mortes de oct 2023 à 09/2024 soit **+14%**
(normale = taux moyen 3 ans)

Départements Pyrénées Atlantiques et Hautes Pyrénées

Premiers départements impactés par la MHE




Anomalie estimée à + 1 100 têtes, sur 4 200 vaches mortes
de 10/2023 à 09/2024 soit **+33 %**
(normale = taux moyen 3 ans)

Entre Oct 2023 et Sept 2024
Une surmortalité **de 33 %** des
vaches allaitantes adultes **dans**
les premiers départements
impactés par la MHE

Départements Cantal et Aveyron

Premiers départements impactés par le BTV8 nouveau variant

Zoom dépt 12,15




Anomalie estimée à + 1 900 têtes, sur 7 900 vaches mortes
de 10/2023 à 09/2024 soit **+31 %**
(normale = taux moyen 3 ans)

Entre Oct 2023 et Sept 2024
Une surmortalité **de 31 %**
des vaches allaitantes
adultes **dans les premiers
départements impactés
par le BTV8 nouveau
variant**

Impact sur la fertilité apparente des vaches allaitantes

Evolution de la fertilité apparente (naissances / nb vaches) moyenne mobile 12 mois centrée, base 100 en 2022

GEB - Idele d'après SPIE -BDNI et Normabev



Impact sur la Fertilité
apparente*
(en point pour 1000)

France entière :
Baisse de 1,8 points

Cantal, Aveyron:
Baisse de 3 points
pour mille


**Pyrénées Atlantiques
et Hautes Pyrénées :**
baisse de 4,2 points

*Comparaison de la moy
mobile sur 12 mois de
fin 1^e Trim 24 / fin 1^e Trim 23


La moyenne mobile sur 12 mois permet de prendre en compte le décalage tendanciel des vêlages

FCO & MHE – La répartition territoriale des vecteurs et la durée des périodes d'inactivation vectorielle conditionnent l'évolution des maladies

Abondance de culicoïdes en France



Estimation des périodes d'inactivité vectorielle (2009-2012)



Quel est l'impact du changement climatique sur le risque de transmission FCO et MHE en Europe ?

■ Simulations sur les événements passés (1960-2008)

- Les conditions climatiques en Europe du Nord étaient favorables à la transmission de la FCO 15 ans avant son émergence en 2006
- Le risque augmente avec :
 - une diminution du temps nécessaire à la réplication du virus dans les *Culicoides* en Europe du Nord,
 - une augmentation du ratio vecteur-hôte en Europe du Sud



■ Simulation pour le futur (2030-2050)

- Le risque augmente plus rapidement au Nord qu'au Sud (4,3% vs 1,7%/10 ans)
- Au Nord : importance de la température : impacte fortement le temps de réplication du virus dans les *Culicoides*



Anticiper et se préparer

- ➔ Réaliser une **veille active** : assurer une meilleure diffusion de la Veille Sanitaire Internationale
- ➔ Produire un **livrable « Fiche maladie »**
Surveillance événementielle adaptés/pertinents/suffisants



Accueil

Veille Sanitaire Internationale (VSI)



Foyers de fièvre aphteuse en Afrique du Nord (point au 08/02/2024)

- ➔ Anticiper échanges avec les autres Etats Membres / **Diplomatie sanitaire**
- ➔ Améliorer la **réactivité de la réglementation** pour décliner les contraintes



Améliorer le suivi et la gestion

❑ Améliorer le suivi de la situation épidémiologique

- Collecte, accès et traitement des données
- Développement d'outils d'évaluation rapide des conséquences cliniques en élevage

→ Être rapidement en mesure d'adapter la lutte

❑ Diffuser une information claire, fiable et rapide aux acteurs et aux éleveurs

- Production de bilans sanitaires accessibles

❑ Être rapidement en mesure d'adapter l'accompagnement des éleveurs

→ Organisation d'une cellule de crise pour savoir qui fait quoi et quand et comment ?

Progresser dans les moyens de maîtrise

Les axes à travailler

- ☐ Des vaccins disponibles
- ☐ Lutter contre la prolifération des vecteurs
- ☐ Limiter l'exposition.. en limitant l'utilisation de biocides
- ☐ Progresser dans la gestion intégrée des maladies vectorielles
- ☐ Mobiliser la sélection génétique

**Un long chemin à parcourir, mais
une anticipation indispensable**



Conférence Grand Angle Viande
11^e édition
Mercredi 13 novembre 2024



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas et le replay prochainement sur idele.fr



Remerciements à Eva GROSHENS et Hélène FUCHEY (Idele)
pour les analyses sur la mortalité et sur la fertilité apparente

En collaboration avec :



#GAViande