


Résavip est le réseau national de surveillance des virus influenza A détectés chez le porc (VIP) en France métropolitaine. Son objectif est d'approcher la diversité et la dynamique des VIP sur le territoire. Chaque trimestre et chaque année, Résavip publie un bulletin d'information national. Ces bulletins sont publics et mis en ligne sur le site de la Plateforme ESA.

Résavip est un outil de surveillance nationale. Il offre à l'éleveur et au vétérinaire un résultat de détection moléculaire (positif ou négatif) rapide. Les analyses de sous-typage sont réalisées par le Laboratoire National de Référence Influenza porcin (Anses) et le résultat est généralement disponible sous un mois.



Nombre de visites d'élevages réalisées par les vétérinaires volontaires de Résavip

Bilan du 4^{ème} trimestre 2025 :

Le nombre de visites de ce 4^{ème} trimestre 2025 a nettement augmenté par rapport au trimestre précédent et est de 101 (contre 67 au trimestre précédent). Ce nombre élevé de visites n'avait pas été atteint au cours d'un trimestre depuis 2020. Les visites ont été réalisées dans 8 régions différentes. Le taux de positivité est stable par rapport au précédent trimestre avec 47,5% des cas positifs.

Le lignage H1_{av}N2 prédomine au cours de ce trimestre, suivi par le lignage H1_{av}N1. Deux virus H1_{pdm}N1_{pdm} ont été rapportés en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire. Dans un élevage breton, des animaux de 10 semaines d'âge se sont révélés être infectés par 2 virus différents (H1_{pdm}N1_{pdm} et H1_{av}N2). Dans les Hauts-de-France, un cas d'infection à virus H1_{hu}N1 d'une part, et un cas d'infection à virus H1_{hu}N2 d'autre part, ont été identifiés chez des animaux en engraissement.

101 visites d'élevage au 4^{ème} trimestre 2025



Motif de la visite

81% Syndrome grippal

16% Routine

3% Non renseigné



Répartition mensuelle des visites

31,7% en octobre

36,6% en novembre

31,7% en décembre




Formes épidémiologiques de la grippe

63% Classique¹

29% Récurrente²

8% Non renseignée

Type d'élevage




Intensité des signes cliniques


68% Normale

16% Elevée

16% Non renseigné




Des visites dans 17 départements de 8 régions



1. Forme épisodique à l'échelle de l'élevage, pouvant se propager sur différentes classes d'âge au moment de l'épisode, sans caractère de récurrence à âge fixe.

2. Forme persistante à l'échelle de l'élevage, se répétant sur chaque bande ou presque dans une gamme d'âge déterminée.

	Nombre de visites d'élevages	Nombre d'élevages	Nombre d'élevages positifs	H1avN1	H1avN2	H1huN1	H1huN2	H1pdmN1pdm	Sous-type indéterminé ou partiellement déterminé
Auvergne-Rhône-Alpes	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Bretagne	74	63	35	6	21	0	0	1	6
Hauts-de-France	6	6	2	0	0	1	1	0	0
Nouvelle-Aquitaine	8	4	3	2	0	0	0	0	1
Occitanie	2	2	2	1	0	0	0	0	1
Pays de la Loire	7	6	5	2	2	0	0	1	0
Bourgogne-Franche-Comté	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Total national	101	85	48	12	23	1	1	2	8



Pour devenir vétérinaire volontaire de Résavip inscrivez-vous auprès de l'animateur régional qui vous fournira les kits de prélèvements et le document d'accompagnement des prélèvements. Pour plus d'informations veuillez contacter la coordinatrice nationale jmarchand@lacoopagri.coop