Conférence
Grand Angle Viande



#GAViande

En collaboration avec :

13e édition
Jeudi 12 novembre 2026







Conférence Grand Angle Viande
13e édition
Jeudi 12 novembre 2026

Bilan de la situation fourragère 2026

S.Schetelat, A.Madrid, M.Merlhe

En collaboration avec :

Suivre l'état des prairies et fourrages en France chaque mois



Pour vous abonner à la newsletter :
https://idele.fr/detail-dossier/suivi-agroclimatique

Note qui fait le point chaque mois de mars à novembre sur :

- La **météo du mois précédent** (température, pluviométrie) et ses conséquences (indice d'humidité des sols, niveaux des nappes)
- La **situation des prairies et des fourrages** dans les différentes régions françaises
- Les **conseils pour le mois prochain** à travers différents documents techniques et vidéos

Note réalisée dans le cadre du **RMT Horizons Prairies**, avec l'appui financier du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire

Hiver 2025-2026 : doux et très pluvieux


Une mise à l'herbe retardée




- Maintien d'un certain niveau de croissance hivernale
- Redémarrage précoce de la végétation à partir de fin février
- Mise à l'herbe retardée par le manque de portance

Source : RMT Horizon Prairies, Note agroclimatique et prairies n1 - https://idele.fr/detail-article/mars-2026-un-hiver-doux-et-pluvieux-qui-dynamise-la-pousse-mais-complique-la-mise-a-lherbe

Le printemps : très chaud et sec





Source : Météo-France, bilan climatique du printemps 2026 - https://meteofrance.fr/actualite/publications/2026-les-bilans-climatiques

Le printemps : très chaud et sec

Pas de pic de pousse de l'herbe ce printemps



Courbe de croissance de l'herbe en Pays de la Loire





Source : Bulletin Pousse de l'herbe Pays de la Loire

- Pousse de l'herbe freinée par le vent et les nuits froides, puis le manque d'eau et les alternances chaud/froid → **pic de pousse de l'herbe pas atteint**
- Bonnes fenêtres météo pour les récoltes :
  - Précoces (quantités variables, qualités correctes)
  - Tardives (quantités limitées, qualités moyennes quand mauvaise gestion des épiaisons rapides)
- Semis de printemps dans de bonnes conditions
- Dans le grand Ouest : attaques de géomyzes sur maïs suite à l'épisode frais de mai

Source : RMT Horizon Prairies, Notes agroclimatiques et prairies n2, n3 et n4 - https://idele.fr/detail-dossier/suivi-agroclimatique-de-lannee-2026


L'été : caniculaire et extrêmement sec





Source : Météo-France, bilan climatique de l'été 2026 - https://meteofrance.com/presse/bilan-climatique-de-lete-2026-juin-juillet-aout

L'été : caniculaire et extrêmement sec




Source : Météo-France, bilan climatique de l'été 2026 - https://meteofrance.com/presse/bilan-climatique-de-lete-2026-juin-juillet-aout

L'été : caniculaire et extrêmement sec

Les prairies à l'arrêt cet été





Source : Observatoire régional de la croissance de l'herbe en Normandie, nov. 2026

- Pousse de l'herbe à l'arrêt depuis mi-juin et prairies grillées → affouragement parfois à 100% de la ration
- Forte mobilisation des stocks des années précédentes et de ceux constitués au printemps → manque du fourrage pour cet hiver et achat précoce
- **Déficit de production généralisé avec des disparités régionales**
- En montagne, des descentes d'estives et alpages anticipées par manque d'eau et/ou ressource fourragère

Source : RMT Horizon Prairies, Notes agroclimatiques et prairies n5 et n6 - https://idele.fr/detail-dossier/suivi-agroclimatique-de-lannee-2026

L'été : caniculaire et extrêmement sec

Mauvaises conditions pour les maïs



- Maïs peu développés (froid mi-mai puis sec et très chaud fin mai)
- Conditions très chaudes au moment de la floraison fin juin et début juillet → mauvaise fécondation des grains → épis peu développés et peu remplis à cause de la sécheresse → **ensilages de maïs faibles en amidon**
- Brûlures du feuillage (vagues de chaleur de fin mai et mi-juin) → ensilages très précoces dès début juillet
- Ensilages généralisés depuis début août → baisses de rendement estimées entre -15% et -70%, à affiner suite à la clôture de la campagne


Source : RMT Horizon Prairies, Notes agroclimatiques et prairies n5, n6 et n7 - https://idele.fr/detail-dossier/suivi-agroclimatique-de-lannee-2026

L'automne : toujours aussi sec


Rapport à la moyenne mensuelle de référence 1991-2020 du cumul des précipitations




Août 2026




Septembre 2026




Octobre 2026




Indicateur d'humidité des sols




au 31 août 2026



au 30 septembre 2026




au 30 octobre 2026




Sources : Météo-France, bilans climatiques et bulletins de situation hydrologique

L'automne : toujours aussi sec



Années du record absolu quotidien de sécheresse des sols par département
Bilan au 1er octobre 2026




- Une situation record en septembre et jusqu'à mi-octobre
- Une réhumidification légère à partir de mi-octobre, insuffisante et tardive

Sources : Météo-France, bilans climatiques de septembre et octobre 2026

L'automne : toujours aussi sec

Un reverdissement timide et hétérogène




Source : Bulletin Herbe et Fourrages Nouvelle Aquitaine, nov. 2026

- Diversité de situations liée à la répartition des pluies d'automne
- Déficit se creuse dans les régions peu arrosées. Léger reverdissement sans pousse significative, espèces de faible intérêt fourrager.
- Là où il a plu en octobre, reprise plus tardive qu'habituellement qui a pu permettre du pâturage et/ou des récoltes
- Semis de fin d'été compliqués ou reportés, des semis sous couvert de méteil réalisés plus tard
- **Bilans très fragiles avec des consommations de stocks importantes.**

Source : RMT Horizon Prairies, Notes agroclimatiques et prairies n7 - https://idele.fr/detail-dossier/suivi-agroclimatique-de-lannee-2026

L'automne : toujours aussi sec
Un reverdissement timide et hétérogène

Indicateur de rendement des prairies permanentes par région fourragère au 31 octobre 2026, d'après le dispositif ISOP (basé sur le modèle STICS-Prairie)



Au 31 octobre selon ISOP :

- Une légère (et hétérogène) reprise de la pousse en octobre
- **Un déficit de 42 %** à l'échelle nationale par rapport à la pousse de référence 1989-2018
- Des disparités régionales :
  - PACA dans la normale
  - Un déficit de 50 % en Bourgogne Franche Comté, un peu plus dans le Grand Est

Sources : INRAe, Météo France, SSP. ISOP – Information et suivi objectif des prairies au 31 octobre 2026

Les actions à court terme pour passer le cap



- Réaliser un bilan fourrager avant et après période hivernale
- Faire analyser ses fourrages pour caractériser leur valeur et adapter au mieux les conduites alimentaires
- Apporter du fumier sur les prairies de fauche en priorité
- Faire un état des lieux des prairies pour anticiper les semis de printemps
- Evaluer la possibilité de semer des mélanges CER-PRO et/ou RGI-RGH au printemps
- S'assurer de bonnes conditions de portance à la mise à l'herbe au printemps







Conférence Grand Angle Viande
13e édition
Jeudi 12 novembre 2026

Conséquences technico-économiques et adaptations mises en place en 2026

Christèle PINEAU
Equipe GEB
Réseau INOSYS

En collaboration avec :

•Canicules et Sécheresse 2026 :

- **Première évaluation à chaud**
- **des impacts sur les élevages,**
- **des pistes d'action à court et moyen/long terme**
- **des accompagnements proposés.**

Une enquête auprès des ingénieurs départementaux et régionaux – Septembre 2026

• Résultats Enquête Inosys – Sécheresse 2026


- 160 réponses sur tout le territoire, individuelles ou de groupe

bovins lait	bovins viande	ovins lait	ovins viande	CAPRINS	EQUINS	VEAUX DE BOUCHERIE
19 enquêtes + 3 équipes Régionales	28 enquêtes	2 enquêtes Retour des élus CNBL	13 enquêtes, 1 réunion d'équipe	13 enquêtes	82 enquêtes (dont 70 d'éleveurs) 1 réunion d'équipe	1 réunion d'Equipe 1 enquête en Dordogne
10 Régions	**12 Régions**	**2 Régions**	**6 Régions**	**6 Régions**	**9 Régions**	**4 Régions**

• Des reports de stocks non négligeables mais très variables, et insuffisants


- Prévoir et utiliser le report de stocks devient une **pratique habituelle en été**
- Stocks de qualité médiocre
- Demande de dérogations des AOP
- Problèmes de disponibilité des coproduits
- Peu de semis d'automne ni de dérobées
- Ensilage du maïs destiné initialement au grain

- *Zones herbagères : moins d'alternatives, plus de difficultés*
- *En équins ou systèmes peu autonomes : très peu de stocks*



• Une situation tendue à critique sur les achats

- Besoin d'achat supplémentaire de foin :
  - 0 à 1-3 tMS /UGB,
  - Disponibilité **Tendue à Pénurie Critique**
- Situation très variable pour la paille
- Prix moyen constaté :
  - de **100 à 300€/TMS** foin / enrubanné
  - de **90 à 130€/T MS** paille
- Disponibilité : **Tendue à Pénurie Critique**



Nombreux impacts techniques


Tarissement des sources
Restrictions
Surconsommations
Descentes d'estives

Chute de fertilité, avortement, Incertitudes


Stress thermique, Troubles respiratoires Quelques mortalités

+/- Production laitière (-10% caprins)
Croissance des jeunes


Abreuvement




Reproduction



Santé et bien-être



Production - Croissance




inosys
RÉSEAUX D'ÉLEVAGE


NON – Modéré – Fort - Critique

Impact travail lourd et trésorerie à venir

Abreuvement, Affouragement Stress, voire angoisse

Très variable, et plutôt à venir





NON – Modéré – Fort - Critique







Conférence Grand Angle Viande
13e édition
Jeudi 12 novembre 2026

Evaluation prévisionnelle

Impacts des canicules et de la sécheresse sur les résultats économiques des ateliers herbivores





En collaboration avec :

Un chiffrage économique de l'impact sur les productions végétales présentes (Fourrages et cultures auto-consommées)

- Constitution de grandes zones de production propres à chaque filière herbivore
- Utilisation des bilans alimentaires moyens par zone et par UGB BV (source INOSYS),
- Utilisation sources disponibles de perte de production :
  - Maïs /Céréales ARVALIS et Agreste ,
  - Prairies / indices ISOP – INRAE - Météo France au 30/09
- Enquête sur le prix des fourrages de substitution :
  - Prix de fourrage de proximité (maïs ensilage),
  - Rations alternatives (mélange : maïs ensilage, foin, paille, concentrés…).
- Chiffrage du coût de remplacement des fourrages (ISO UF) pour une campagne annuelle, à cheptels et besoins alimentaires constants

Zonage d'étude :

Bassins	Composition
Plaine	Hauts de France, Grand Est, Bretagne, Pays de la Loire
Montagne	Massif central (Bassin Charolais, Bassin Limousin), AURA, Occitanie, Pyrénées

Hypothèses de pertes des productions fourragères

Maïs ensilage

- **Les pertes de rendement basées à l'échelle des régions : de -15 % à -70 % (par rapport à une moyenne quinquennale)**
- **Une perte de 10 % de la valeur énergétique (peu ou pas de grain) est intégrée**

Herbe

- **Les indices ISOP (publiés par Agreste au 30/09/2026)**
- **Pousse nulle sur la suite de l'automne.**

Impacts des canicules et sécheresse sur les résultats économiques des ateliers Herbivores

	Hypothèses de Coût UF substitution	
Libellé région clim.	€/UF Min Fourrage de proximité Achats/commandes précoces	€/UF Max Ration alternative Achats/commandes tardifs
Plaine avec maïs	0,12	0,25
Plaine sans maïs et montagne	0,25	0,35

- **Un coût d'UF de substitution issu d'achats de fourrages de proximité**
  - ex: maïs ensilage acheté sur pied et à moins de 10 km à un tarif généralement négocié dès juin 2026 ou d'achats/commandes réalisés en début d'été à des tarifs avant majoration des prix.


- **Un coût d'UF de substitution issu d'une ration reconstituée dite alternative**
  - correspond à une mixité de substituts achetés, le plus souvent dans l'urgence, en fin d'été-début d'automne et souvent avec des disponibilités très limitées (maïs ensilage enrubanné avec transport, paille, foin, concentrés, co-produits...).

Impacts des canicules et sécheresse sur les résultats économiques des ateliers Herbivores

€/UGB		Plaine	Montagne
Pertes de productions fourragères moins fortes	Fourrage de proximité	175 €	355 €
	Ration alternative	365 €	495 €
Pertes de productions fourragères plus fortes	Fourrage de proximité	305 €	575 €
	Ration alternative	635 €	800 €

• Pistes d'adaptations « en urgence » par les éleveurs INOSYS enquêtés


• Pistes d'adaptations « en urgence »




- **Et aussi : apport d'eau dans les pâtures,**
- **Utilisation de surfaces additionnelles et descentes tardives d'estives**

• Accompagnements d'urgence et à venir

Appuis en place dans les départements



Appuis pour les prochains mois



Au-delà de ces chiffrages : une trésorerie mise à mal



⇒ **Déficit exceptionnel = achats exceptionnels** mais très dépendants des contextes et des possibilités d'achats de fourrages à des prix accessibles

⇒ Prise des décisions fonction de la **trésorerie disponible** et des solutions de **financements possibles**

⇒ Perte de la **souplesse financière**



⇒ Un **stock fourrager** à reconstituer

⇒ Une adaptation du système à poursuivre : vers plus de **surfaces en herbe**?

⇒ Des **coûts de remise** en état des prairies

=>**Risque de décapitalisation** des cheptels : Davantage de vaches de réformes et peut-être moins de JB pour 2027 et les années suivantes?







Conférence Grand Angle Viande
13e édition
Jeudi 12 novembre 2026

Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas et le replay prochainement sur idele.fr

Plus d'informations :



https://idele.fr/detail-dossier/suivi-agroclimatique

En collaboration avec :

Remerciements :

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

#GAViande